

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷五十四

詳校官太醫院醫士程泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官學正臣郭祚熾

謄錄監生臣饒文洲

欽定四庫全書

證治準繩卷五十四

明 王肯堂 撰

女科

治法通論

通治

保婦人童幼天癸未行之間皆屬少陰天癸既行皆屬厥陰天癸既絕乃屬太陰經也治胎產之病從厥陰者

是祖氣生化之原也。厥陰與少陽相表裏，故治法無犯胃氣及上三焦為三禁。不可汗，不可下，不可利。小便若發汗者，同傷寒下早之證。利大便則脈數而已，動于脾利小便則內亡津液。胃中枯燥，制藥之法能不犯此三禁，則榮衛自和而寒熱止矣。外則和于榮衛，內則調于清便。先將此法為初治，次後詳而論之。見證消息同壞證，傷寒為之緩治，或小便不利，大便秘結，或積熱于腸胃之間，或已成痿或散血氣而為浮腫，蓋產理多門，故

曰同傷寒壞證如發渴而用白虎氣弱而用黃芪血刺
痛而用當歸腹痛而加芍藥已上例證不犯三禁謂產
後之久病也若產後暴病又不可拘也如產後熱入血
室者用桃仁承氣抵當湯等藥胃堅燥者大承氣不可
以泄藥言之產後世人多用烏金四物湯是不分四時
之寒熱不分血氣之虛實盲然一槩用藥如此而愈加
增劇是誤也大抵產病天行則增損柴胡雜證則加減
四物又春夏從柴胡秋冬從四物藥性寒熱病證虛實

不可不察也四物湯常宜服餌今立四時增損法于後
養血四物湯 益榮衛滋氣血治月水不調臍腹痛
婦人經病或前或後或多或少疼痛不一腰足腹中
痛或崩中漏下或半產惡露過多或停留不出妊娠
腹痛下血胎不安產後血塊不散或亡血過多惡露
不止四物湯加茱萸煎服若人陽臟少使茱萸陰臟
多使茱萸一方加香附

熟地黃

補血如臍痛非此不能
除乃通臍經之藥也

川芎

治風泄肝木
如血虛頭痛

非此不能除乃
芍藥
和血理脾如腹中虛痛非此
通肝經之藥也

當歸
和血如血刺痛利如刀割非
此不能除乃通腎經之藥也

右為麤末水煎服
春倍川芎
一曰春二曰脈
弦三曰頭痛
夏倍

芍藥
一曰夏二曰
脈洪三曰泄
秋倍地黃
一曰秋二曰脈
濇三曰血虛
冬倍當

歸
一曰冬二曰脈沈
三曰寒而不食
若春則防風四物加防風倍

川芎
若夏則黃芩四物加黃芩倍芍藥
若秋則

門冬四物加天門冬倍地黃
若冬則桂枝四物加

桂枝倍當歸
若血虛而腹痛微汗而惡風四物加

茂桂謂之腹痛六合 若風眩暈加秦艽羌活謂之

風六合 若氣虛弱起則無力趺然而倒加厚朴陳

皮謂之氣六合

氣不足而用泄氣之藥可乎當以參芪易之

若發熱而

煩不能睡卧者加黃連梔子謂之熱六合 若虛寒

脈微自汗氣難布息清便自調加乾薑附子謂之寒

六合 若中濕身沉重無力身涼微汗加白朮茯苓

謂之濕六合 若婦人筋骨肢節疼及頭痛脈弦憎

寒如瘧宜治風六合或傷損氣血乘虛而暈者四物

湯

四兩

羌活防風

各一兩

若血氣上衝心腹脇下滿悶

宜治氣六合四物湯

四兩

木香檳榔

各一兩

若臍下虛

冷腹痛及腰脊間悶痛宜延胡六合

小腹痛同用

四物湯

四兩延胡苦楝

各一兩碎炒焦

若氣衝經脈故月事頻併臍

下多痛宜芍藥六合四物湯

四兩

芍藥

倍加

黃芪

一兩

若

經事欲行臍腹絞痛臨經痛者血澀也宜八物湯四

物湯

四兩

延胡檳榔苦楝

碎炒焦

木香

各一兩

若婦人血

虛心腹疼痛不可忍者去地黃加乾薑名四神湯

補下元加乾薑半兩甘草七分 氣築小腹痛加延

胡索煎服 若腹中刺痛惡物不下倍加當歸芍藥

若腹痛作聲經脈不快加熟地黄一倍添桂心半

倍煎 經行腹痛腰背痛加芫薑牛膝紅花吳茱萸

菴閭甘草銀器燈心熱服 若經水澀少宜四物湯

內加葵花煎又加紅花血見愁 若經水少而色和

者四物湯加熟地黄當歸

各一兩

若經水暴下四物

湯內加黃芩若腹痛加黃連如夏月不去黃芩 若

經水如黑豆汁者加黃芩黃連

各一兩

若經水過多

別無餘證宜黃芩六合湯四物湯

四兩

黃芩白朮

各一兩

經血淋漓不斷加乾瑞蓮房炒入藥 陰陽交合

經脈行加赤石脂黃芪肉桂百草霜藕節敗椶灰肉

豆蔻當歸木香龍骨白朮茯苓地榆 若經水適來

適斷或有寒熱往來者先服小柴胡湯以去其寒熱

後以四物湯和之如寒熱不退勿服四物是謂變證

表邪猶在不能效也依前論中變證隨證用藥調治

若血崩者加生地黃蒲黃 補血住崩加百草霜

椶灰首綿灰蒲黃炒過龍骨白薑 血成片加地黃

藕節 黑血片人參白朮 若血臟虛冷崩中去血

過多加阿膠艾 月水不調血崩或多少或前後嘔

逆心膨陳艾黃芪 若赤白帶下宜香桂六合四物

湯

四兩

桂枝香附

各五錢

四物湯為細末煉蜜丸梧子大

空心米飲下三四十丸治年高婦人白帶良驗 白

淫濁龍骨地黃當歸 五色研麝香好酒 鮮紅溫

酒鹽湯 帶下加肉桂蒲黃百草霜甘草黑豆白木
延胡索白薑龍骨空心鹽酒下 白帶加白龍骨酒

下 若婦人血積者加廣茂京三稜桂乾漆

炒烟盡
各一兩

若經血凝滯腹內血氣作疼加廣茂官桂等分用
之王石膚云熟地黃滯血安能止痛不若以五靈脂
代之 血滯不通加桃仁紅花各二錢半 經閉加

枳殼大黃荆芥黃芩青皮滑石木通瞿麥海金沙山
梔子車前子 血寒加甘草烏梅柴胡桃柳枝 月

經久閉加肉桂甘草黃芪宣薑棗子木通紅花 月
水不通加野苧根牛膝紅花蘇木陳酒水同煎 血
氣不調加吳茱萸一兩甘草半兩 四物湯加甘草
半兩為細末煉蜜丸每兩作八丸酒醋共半盞煎湯
同化調下名當歸煎去敗血生好血如人行五里再
進一服無時 若虛熱病四物湯與參蘇飲相合名
補心湯主之 添柴胡名五神湯大能補虛退虛熱
潮熱加黃芩地骨皮柴胡一方加柴胡乾葛黃芩

人參 虛熱口乾加麥門冬黃芩一兩 虛渴加人

參乾葛烏梅栝蒌根 虛而多汗加煨牡蠣麻黃根

各半兩

虛寒潮熱加柴胡地骨皮白朮茯苓甘草秦艽

知母黃芩麥芽貝母人參烏梅棗子 若四肢腫痛

不能舉動宜與蒼朮各半湯主之 若大便燥結四

物湯與調胃承氣湯各半名玉燭散主之 若流濕

潤燥宜四物理中各半湯 若氣血俱虛四物與四

君子湯各半名八珍湯主之加縮砂仁保胎氣令人

有子有熱加黃芩

若因熱生風者加川芎柴胡防

風

一方無

血氣勞加荆芥柴胡

血氣兩脇築痛或

盤腸成塊加大黃單撥乳香

血弱生風四肢痺疼

行步艱難加人參乳香沒藥麝香甘草五靈脂羌獨

活防風荆芥地龍南星白附子澤蘭為末蜜丸木瓜

鹽湯下

血氣膨脹加甘草木香枳殼馬兜鈴亭陸

紫蘇藿香地黃空心服

臟腑秘加大黃桃仁 滑

泄加官桂附子

虛瀉加人參川芎白芷蒲黃炒阿

膠白朮茱萸續斷乾薑附子肉桂黃芪赤石脂甘草

蜜丸鹽梅湯下

嘔加白朮人參

一方有生薑

嘔血不

止加藿香白朮半兩人參二錢半

嘔逆飲食不入

加白朮乳香甘草人參縮砂益智仁胡椒 若欬嗽

加桑白皮半夏人參生薑北五味子甘草 感風勞

嗽加款花知母阿膠半夏麻黃甘草馬兜鈴黃芩杏

仁柴胡宣薑烏梅訶子 若發寒熱加乾生薑牡丹

皮柴胡

一方加芍藥

如寒熱往來加炮乾薑牡丹皮

各一

分

若平常些少虛眩肢體瘦倦月信不通只用生
薑薄荷此是婦人常服之藥蓋味寡而性緩效遲而
功深 若大渴加知母石膏 若水停心下微吐逆
者加豬苓茯苓防已 若心腹脹滿加枳殼青皮
虛汗加麻黃根 汗多加浮麥 大便下血四肢寒
膨脹腸胃有風槐花枳殼漏蘆荊芥木香白雞冠花
木通紅內消紫草石榴皮陳皮青皮黃芩甘草白茅
根槐角 腸風下血加槐角槐花枳殼荊芥黃芩大

腹皮紅內消地榆石楠葉白雞冠花為散煎一半為
末空心鹽湯陳酒調下 鼻衄吐血加竹青蒲黃藕
節半夏丁香訶子桂花紅棗飛羅麪白茅根蚌粉

若頭昏項強加人參黃芩 若虛寒似傷寒者加人

參柴胡防風 若虛煩不得睡加竹葉人參 若諸

痛有濕者四物與白朮相半加天麻茯苓穿山甲用

酒煎服 治老人風秘加青皮等分煎服 治瘡疾

荊芥酒煎常服 妳癰加連喬茨菰子紅內消白芷

菰片荊芥牛膝山蜈蚣乳香沒藥漏蘆生地黃 赤
眼頭風疾加薄荷清茶 赤眼生風加防風黃芩

風瘡赤腫加荊芥牛蒡子何首烏甘草防風羌活地
黃鹽酒 脚腫加大腹皮赤小豆茯苓皮生薑皮

若婦人傷寒汗下後飲食減少血虛者宜八物湯四

物湯 四兩 黃芪白朮茯苓甘草 各一兩 若妊娠傷寒中

風表虛自汗頭痛項強身熱惡寒脈浮而弱太陽經

病宜表虛六合湯四物湯 四兩 桂枝地骨皮 各七錢 若

妊娠傷寒頭痛身熱無汗脈浮緊太陽經病宜表實

六合四物湯

四兩

麻黃細辛

各半兩

若妊娠傷寒中風

濕之氣肢體煩疼脈浮而熱頭痛此太陽標病也宜

風濕六合湯四物湯

四兩

防風蒼朮

各七錢

若妊娠傷

寒下後過經不痛溫毒發斑如錦紋宜升麻六合四

物湯

四兩

升麻連翹

各七錢

若妊娠傷寒胸膈滿痛脈

弦少陽頭昏項強宜柴胡六合四物湯

四兩

柴胡黃芩

各七錢

若妊娠傷寒大便鞭小便赤氣滿而脈沈數

陽明太陽本病也急下之宜大黃六合四物湯

四兩

大

黃

半兩

桃仁

十箇去皮尖麤炒

若妊娠傷寒汗下後欬嗽不

止宜人參六合湯四物湯

四兩

人參五味子

各半兩

若

妊娠傷寒汗下後虛痞脹滿者陽明本虛也宜厚朴

六合湯亦治欬嗽喘滿四物湯

四兩

厚朴枳實

麤炒各半兩

若妊娠傷寒汗下後不得眠者宜梔子六合湯四

物湯

四兩

梔子黃芩

各半兩

若妊娠傷寒身熱大渴蒸

蒸而煩脈長而大者宜石膏六合四物湯

四兩

石膏知

母

各半
兩

若妊娠傷寒小便不利太陽本病宜茯苓

六合湯四物湯

四
兩茯苓澤瀉

若妊娠傷寒太

陽本病小便赤如血狀者宜琥珀六合湯四物湯

四
兩

琥珀茯苓

各半
兩

若妊娠傷寒汗下後血漏不止胎

氣損者宜膠艾六合湯四物湯

四
兩阿膠艾

各半兩一
方加甘草

同上
一方加乾

若妊娠傷寒四肢拘急身涼微汗

腹中痛脈沈而遲少陰病也宜附子六合湯四物湯

四
兩附子

炮去
臍皮桂

若妊娠傷寒畜血證不宜墮

胎藥下之宜四物大黃湯四物湯

兩

生地黃大黃

酒浸

各半

兩 四物與麻黃桂枝白虎柴胡理中四逆茱萸

承氣涼膈等皆可作各半湯不能殫述此易老用藥

大畧也 安胎及漏胎下血加阿膠大艾甘草蒲黃

炒過 若胎動不安下血不止每服加艾葉五七片

更加葱白阿膠末黃芪減四味之半當歸只用小半

如疾勢甚者以四味各半兩細剉以水四盞熟艾一

塊如雞子大阿膠五七片煎至二盞半去滓分作四

服一日令盡一方加粉草乾薑黃芪日二三服至二

臘

以一七日為一臘

胎前產後每日可一二服亦治血痢

不止腹痛難忍宜加阿膠艾葉煎服名六物湯如氣
虛血海不調不妨一方四物加黃芪柏葉阿膠甘草
續斷平常經血淋瀝不斷或多或少或赤或白非時
漏下多服有效 受胎小腸氣痛加水香懷香胎前
嗽加枳殼甘草款冬知母馬兜鈴半夏木通葶藶人
參苦梗麥門冬 胎氣衝肝腰脚痺行步艱難加枳

殺水通連翹荆芥地黃羌活山梔甘草燈心空心服
妊娠心煩加竹茹一塊 如有敗血則用當歸近
上節白芍藥以赤易熟地黃以生者 妊娠作惡生
寒面青不思飲食憔悴加陳皮枳殼白朮茯苓甘草
損孕下血不止頭痛寒熱耳鳴氣血勞傷所致加
黃芩荆芥生地黃赤芍藥生薑 臨產小腹緊痛加
紅花滑石甘草燈心葵子 產後惡露腹痛不止加
桃仁蘇木牛膝 產後腹痛血塊攻腸加大艾沒藥

好酒 若因產後欲推陳致新補血海治諸疾加生
薑煎 若產後被驚氣滯種種積滯敗血一月內惡
物微少敗血作病或脹或疼胸膈痞悶或發寒熱四
肢疼痛加延胡索沒藥香白芷與四物等分為細末
淡醋湯或童子小便酒調下 如血風于產後乘虛

發作或產後傷風頭疼發熱百骨節痛每四物湯

一兩

加荊芥穗天麻香附子石膏藿香

各二錢五分

每服三錢

水一盞煎至七分服 產後傷風頭痛加石膏

一兩 甘

草

半兩

若產後虛勞日久而脈浮疾者宜柴胡四物

湯乃本方與小柴胡湯合用也 若產後諸證各隨

六經以四物與仲景藥各半服之甚效 產後虛憊

發熱煩悶加生地黃 產後腹脹加枳殼肉桂

各三錢

產後寒熱往來加柴胡麥門冬

各半兩

產後敗血

築心加地骨皮芍藥 產後潮熱加白朮北柴胡甘

草牡丹皮地骨皮 產後病眼加北細辛羌活荆芥

菊花甘草木賊石決明草決明 產後浮腫氣急腹

大喉中水雞聲加牡丹皮荊芥白朮桑白皮赤小豆
大腹皮杏仁半夏馬兜鈴生薑葱白薄荷 產後失

音不語加訶子人參沙蜜百藥煎 產後悶亂加茯

神遠志

各半兩

胎前產後痢後風加乳香龍骨茱萸木

香肉桂蒼朮牡丹皮白薇人參甘草澤蘭大椒藁香
煉蜜為丸木瓜酒下 一方等分為麤末每服四錢

水一盞半煎至八分去滓取六分清者帶熱食前服
若平常血氣不調及常服只用本方日二三服 一

方為細末湯酒調服或以醋糊煉蜜為丸 治帶下

赤白痢陳米飲下 心腹脹炒薑酒下 血氣艾醋

湯下 渾身勞倦為末炒薑酒陳青蒿鹽和調下

虛證四肢黃甘草牡丹皮澤蘭白薇蒼朮桂心蘘香

蜜丸鹽湯溫酒下 陳氏經驗方云吳興周端仁郎

中頃赴省試照贖一隣云某本醫家凡婦人百病只

以四物湯加茱萸無不效者產難及胎衣不下子死

腹中及酒同煎凡用有效謹以此為報此藥不知起

于何氏或云自魏華陀陀之術精微方類單省傳稱
陀鍼灸不過數處千金方云自三代以來醫方藥論
未有如此詳備其間有漢晉名公諸方今產寶方乃
朱梁時節度巡官胥廩所撰其中有四物散後修入
聖惠方自後醫者易散為湯蓋用者若馭良馬當隨
意無不得至焉今名醫于四物中增損品味隨意虛
實寒煥皆得其要者然亦非止婦人之疾可用而已
芎歸湯

元戎

治一切去血過多眩運悶絕傷胎去血產後

崩中去血拔牙去血金瘡去血不止舉頭欲倒悉能治之

當歸 川芎

各等分

右每服五錢水煎服不拘時 產後眩暈加芍藥

產後腹痛不可忍加官桂童便酒浸 妊娠子死或

不死胎動酒水合煎即下未死者即安 若虛損腹

痛少氣頭眩自汗每服加羊肉一兩生薑十片水煎

若臨月服之則縮胎易生 若室女婦人心腹痛

痛經水不調水煎服 若妊娠胎氣不安產後諸疾
酒煎服 若難生倒橫子死腹中先用黑豆一大合
炒熟與小便合煎服 若難產用百草霜香白芷等
分童便好醋各一盞沸湯浸服甚者再服即分娩矣
若傷臟毒每服加槐花末五分三日取下血塊即
瘉若吐血亦服此 若血氣上喘下腫空心煎艾湯
調下 若產後惡血注心迷悶喘急腹痛依前用黑
豆加生薑自然汁煎服 若產後頭痛加荊芥 若

崩中漏下失血不止加炒香附每兩入甘草一錢沸湯點服 若有白帶者加芍藥半兩乾薑等分米飲調下

理氣異香四神散

又名四神湯

專調理婦人室女血氣不調

胎前產後諸疾皆主之蓋女人以氣血為主殊不知因氣先不調然後血脈不順即生諸證此方大有奧理

香附子

去毛炒半斤

烏藥

炒四兩

甘草

炙一兩

右咬咀每服五錢重水一盞生薑三片棗一箇煎至七分去滓空心溫服或用葱白三寸同煎如治諸證依後加減用之立見功效 婦人氣血不順心胸痞滿加紫蘇葉同煎 驚憂悶氣喜怒傷神心滿腹痛面目虛浮及一切氣疾並加石菖蒲同煎 血脈不調血膈翻胃嘔吐飲食以老薑一塊燒令黑切作五片入鹽少許同煎 脾胃感冷亦依前用 血積血暈悶血癥血刺血煎熟入好醋一呷服 經血行時

被風雨或驚憂相併經候不時名曰搐脈腹痛緊脹
腰腿疼痛每服加炒茴香一撮同煎 血氣不順喘
滿氣急面目浮腫加生薑紫蘇葉同煎 唾血咯紅
痰喉中腥氣加黃桑 三四皮花桑尤佳 血滯氣
秘大便結滯不通宜加枳殼數片或去白青皮亦可
凡血臟虛冷血滯腹痛血海久冷血崩赤白帶下
小便頻數又血脈妄行滲入大腸有似腸風並入炒
吳茱萸末一匕同煎亦名溫經湯 經絡感熱經水

沸溢血脈妄行病曰熱崩加生地黃 凡敗血攻冲
脾胃血噎氣血咳逆加生薑三片柿蒂五個 血氣
昏悶心腹刺痛加良薑赤芍藥以水酒各半盞同煎
胎脹傷食胸膈不快噎氣食臭心腹緊滿加南木
香或縮砂仁煎 懷胎臨月近上逼心名曰子懸依
舊用薑片紫蘇同煎 產後諸疾不明血脈去留不
辨虛實冷熱且宜此藥通順血氣不致差互然後隨
證調理 產後寒氣入腹硬緊臍下刺痛名曰寒疝

加炒吳茱萸煎服 產後因產中用力太過子宮脫
下俗名癰病先用此順氣安腸兼以樗樹根或枝梗
同葱白以花椒煎湯熏洗子腸自定及平居女人患
此亦然

蒲黃黑神散調理室女婦人風虛勞冷一切氣血之疾
及胎前產後血滯血暈惡露不快敗血為疾並宜服
之凡生產之後首先進烏金散壓血暈逐惡血第二
日即便常進此藥逐敗血安新血自然百病不生此

方常用百發百中悉得效驗若將調理女人諸疾用
煉蜜為劑每一兩三錢重分作十丸或用酒煮麴糊
為丸如梧桐子大每服三五丸隨證用湯使各以
其病立名稱之名益陰丹又名通真丸又名勝金丹
又名金釵煎又名保生丸又名四順理中散

黑豆

一升炒
熟去皮

香附子末

四兩

乾薑

炮

生薑

地黃

各一兩

右為末每服二錢食前溫酒調下或以酒煮麴糊為
丸如梧桐子大每服三十九丸溫酒米湯任下 新產

敗血不散兒枕塊鞭疼痛者童子小便下 臨產胎

死腹中或死胎不下以黑豆一合醋煮豆熟為度調

藥七分盞暖服其胎即自下 臨產之時胞衣不下

以童子小便同煎酒調下 產後惡露不快血暈沖

心眼昏黑悶昏口噤不省人事並用溫酒調下若稍

重可用秤鎚淬酒服 前項黑神散以煉蜜和劑為

丸如梧桐子大名四順理中丸 新產五脂暴露羸

弱少氣體常自汗以米飲吞下三十丸空心服 若

以煉蜜為丸如彈子大治胎前名保生丸理婦人初
受胎時胎氣不安多臥少起不進飲食名曰惡阻每
服一九細嚼以苧根糯米煎飲送下或以秦艽糯米煎
飲亦可 又漏胎下血不止或下黃赤汁腰腹痛重
以溫酒嚥下兼以膠艾湯法艾湯六物湯安胎飲
又有初結胎氣盛煩壅嘔逆痰涎不喜飲食過腹膨
脹以淡竹刮青同橘皮煎湯送下兼以茯苓半夏湯
或二陳湯下 若因房勞動胎下血名曰傷胎溫酒

下 若妊娠數經墮胎多至半產漏下用溫酒服氣
順攝血自然胎息安固 若妊娠日月不足而一向
似欲產者以真知母煎湯下 若妊娠胎上逼心胎
不近下川芎煎湯下 若妊娠至七八月常服養胎
益血安和子臟仍令易產以枳殼糯米煎湯下但糯米
飲下亦得 若產後用名勝金丹治產後一切諸
疾並以溫酒或米飲下 若補理血虛血勞血氣血
風等病名益陰丹以溫酒米飲下 若女人血冷面

白脫色青筋迸露以酒服良驗 若調理經候滋養
少女名金釵煎丸是經候不調月水湛濁腹常刺痛
及室女血弱陰虛經脈不勻並依前酒飲送下 又
一等少女經脈已行一二次復至一二年又不行或
有四季一行或有三五箇月復至此本血脈柔弱未
充故行脈斷續宜以此藥順氣潤血血旺自通不必
攻之不爾成血癥積塊 成血劫勞氣傳為骨蒸勞
瘵魚百一方沈香勝金丹滋血湯佐之若婦人時行

雜病用大聖通真丸 治諸中風口噤角弓反張手

足痺曳並以羌活同黑豆炒酒下兼以小續命湯烏
拘丸之類 又婦人漏下五色及治血少氣寒面色
青白及產後百日内常服能除宿血生養新血兼益
氣補虛調和衝任不生諸疾皆以溫酒米飲下前蒲
黃黑神散其中藥品佐助溫和看不上眼而自有妙
理與大局方法不同臨產對證且如妊娠一節至精
纔媾一氣方凝經云秘法潮養胞源稍著寒溫即致

損墜故經云舉寒為痛傷熱而驚峻僭湯劑勿可妄
用怒傷胎氣及其生產之後百節開張去血過多津
液燥少陰陽俱虛臟腑怯弱偶有疾傷即成危殆故
經云犯時微若秋毫感病重于嵩岳故涼冷之劑剛
燥之藥尤戒輕用轉生他病若委有冒風感熱之疾
亦是和解隨證調理縱有虛寒極冷之後亦宜用性
溫平和之藥救療漸次加進大溫藥調治切戒粗疎
若依此說則產後胎前百無一失不可取目前之急

亂投湯劑反致其禍罪福非輕切須記之

抑氣養血義術散

隨證斟酌加入

義術

川芎

當歸

去尾

熟地黄

酒蒸洗

白芷

茴香

楊芍藥

甘草

各一兩

右為細末每服二錢鹽酒調下

月水不調銀器燈

心 安胎黃芪生地黃

補虛調氣生薑紅棗

過

身虛腫當歸酒

小便不通滑石末

心虛硃砂研

末調

敗血沖心腹疼如刀刺燒秤錘紅滓酒如不

退五靈脂酒 血閉身疼炒薑酒 吐酸水丁香七

粒煎湯 血風上攻眼目浮腫荊芥 小腹痛木瓜

渾身浮腫薑湯或葱湯 胃虛惡心藿香 頭面

腫赤豆荊芥湯下 血不止木香湯 冷嗽桑白皮

乾柿 頭痛川芎細辛 血風潮熱生薑紅棗 虛

汗麻黃根 吐不止青陳皮 血風腰痛苦薑子搥

碎 女人血結不通手發攣急不知其數薺菜一撮

順流水柳汁 手足痺樟柳根浸酒 女人血氣成

塊築心銀子燈心 血崩赤白帶真龍骨末好紅酒

調 血風中心狂言亂語渾身壯熱桃柳枝七寸

血刺成塊不散菴蘭 女人癖氣膈氣炒茴香酒

婦人不問虛熱傷寒潮熱增寒一切百病先以三服

隨證湯引投之服以他藥調理無不應驗 冷嗽豬

血 心燥豬肝酒 催生順流水滑石禹餘糧榆白

皮坯子乳香葵子酸車草汁煎湯黃柞葉垂下者

胎衣不下再加茂朮地黃竹青 行血菴蘭生地黃

紅花蘇木陳艾減楊芍藥加赤芍藥梢

玉僊散

治婦人諸疾

香附子

瓦礫炒黑
色勿焦

白芍藥

各一兩

甘草

一錢

右為細末每服三錢沸湯下

血崩不止竹葉煎湯

下月水不行手足熱加生薑炒當歸煎木通湯下

月水不勻當歸酒下 頻頻下血不佳米飲下

氣痛及老婦人忽下血加炒薑黃炒陳皮湯任下

理氣活血消積濟陰丹 治婦人血海虛冷久無子息

及產後敗血沖心中風口噤子死腹中擘開口灌藥
須臾生下便得無恙治墮胎腹中攻刺痛橫生逆產
胎衣不下血暈血癖血崩血滯血入四肢一應血臟
有患及諸種風氣或傷風吐逆咳嗽寒熱往來遍身
生瘡頭痛惡心經脈不調赤白帶下乳生惡氣胎臟
虛冷數曾墮胎崩中不定因此成疾室女經脈不通
並宜服之常服煖子宮和血氣悅顏色退風冷能消
除萬病

三稜

二兩

蓬朮

一片一兩切

蒼朮

汴沒去皮

枳殼

去穢

大艾

去梗劉

寄奴

香附子

淨

敗薑

各一兩半

烏豆

三合已上九味以穀醋三升煮

乾取出焙乾

當歸身

酒蒸

橘皮

去白細紅者佳

白芍藥

各一兩半

蒲黃

隔紙炒

牡丹皮

去骨

官桂

去粗皮

赤芍藥

片薑黃

青

皮

去白各一兩

生地黄

酒浸

熟地黄

酒浸

川芎

各七錢半

延胡索

炒

五靈脂

酒煮

白朮

煨各半兩

右為細末以糯米粉穀醋打糊為丸如梧桐子大每服五十丸空心沈香湯送下蘇湯鹽湯下亦可

南嶽魏夫人濟陰丹 治婦人血氣久冷無子及數經

墮胎皆因衝任之脈虛損胞內宿挾疾病經水不時
暴下不止月內再行或前或後或崩中漏下三十六
疾積聚癥瘕臍下冷痛小便白濁已上諸疾皆令孕
育不成以致絕嗣此藥治產後百病百晷內常服除
宿血生新血令人有子亦生子充實亦治男子亡血
諸疾

木香

炮

京墨

煨

茯苓

桃仁

去皮尖

炒各一兩

蠶布

燒

藁

本 秦艽 石斛酒浸 桔梗炒 人參 甘草各二兩

牡丹皮去心 乾薑炮 細辛 桂心 當歸 川芎各半

兩 蒼朮米泔浸 大豆卷炒半 川椒去目并合口炒出汗 山藥半

各三兩 澤蘭葉 熟地黄酒浸 香附子炒各 糯米炒

右為細末煉蜜和丸每兩作六丸如彈子大每服一丸細嚼溫酒送下淡醋湯化服亦可空心食前服一方山藥川椒各三兩或以醋糊為丸如梧桐子大每

服五十九依前服亦可

理氣行血皺血丸 治婦人血海虛冷百病變生氣血
不調時發寒熱或下血過多或久閉不通崩中不止
帶下赤白癥瘕癖塊攻刺疼痛小便緊滿脇肋脹痛
腰重脚弱面黃體虛飲食減少漸成勞狀及經脈不
調胎氣多損產前產後一切病患無不治療

菊花

去梗

茴香

延胡索

炒

香附

炒酒浸

肉桂

去粗皮

當歸

芍藥

熟地黃

牛膝

蒲黃

蓬朮

各三

兩

右為細末用烏豆一升醋煮候乾為末再入醋二盞
煮至一盞留為糊丸如梧桐子大每服二十九溫酒
或醋湯送下血氣攻刺炒薑酒下癥瘕絞痛當歸酒
下忌鴨肉羊血此藥煖子宮令人有子及治皴血損
調衝任煖血海及胞絡傷損宿瘀乾血

理氣和血加味五積散

蒼朮

一兩米泔浸炒

白薑

陳皮

各一兩三錢

厚朴

去粗皮薑汁炒

半

夏洗

枳殼炒

楊芍藥

香附子

桔梗

人參

木香

肉桂

去

茯苓

皮

川白芷

川芎

當歸

去

茴香

炒

木香

肉桂

粉草

各一兩

右剉碎生薑木瓜入鹽煎服

陰證傷寒生薑附子

血脈不勻紫蘇

氣嗽烏梅薑錢

勻經棗子薑

錢補益血海蘇鹽

產後生薑醋炒陳艾

胃冷

不納食陳皮縮砂

赤白帶陳米

冷氣疾木香柴

黃

心燥背筋急頭暈腰脚痠生地黃當歸

脾虛

蘇葉粉草月中被驚或因爭觸心頭結塊五膈五噎茴香

棗子 口苦舌乾吞酸噫氣此為胃冷生薑鹽 腰痛桃

仁木瓜杜仲川續斷 身疼秦艽 諸虛脾胃不和羸瘦

冷氣蘇鹽 冷瀉炒過生薑烏梅肉豆蔻陳米各煎湯

養血潤燥卷栢丸 治婦人衝任本虛血海不足不能

流通經絡月水不調赤白帶下三十六疾並皆治之常

服和經絡煖五臟潤肌膚長髮去黥除風令人有子

卷栢

去根

當歸

洗

艾葉

炒各二兩

熟地黃

洗

川芎

白芷

柏子仁

微炒

肉蓯蓉

牡丹皮

各一兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十丸用溫

酒或米飲送下空心食前服

溫經之劑氣血攻補備焉烏雞煎丸

和劑

治婦人胎前產

後諸般疾患並皆治之

烏雄雞

一隻

烏藥

石牀

牡丹皮

人參

白朮

黃芪

各一兩

蒼朮

米泔浸切焙一兩半

海桐皮

肉桂

去粗皮

附

子

炮去心

白芍藥

蓬莪朮

川烏

炮

紅花

陳皮

各二兩

延胡索

肉豆蔻

木香

琥珀

熟地黃

洗焙

草薢

各半兩

右細剉用烏雄雞一隻湯搗去毛及腸肚將上件藥

安放雞肚中用新磁瓶以好酒一斗同煮令乾去雞

骨以油單盛焙乾為細末煉蜜和丸如梧桐子大每

服三十丸 胎前產後傷寒蜜糖酒下 胎前氣悶

壯熱炒薑酒下 赤白帶下生薑地黃酒下 產後

敗血注心童子小便炒薑酒下 產後血塊填築心

腹疼痛延胡索酒下 胎前嘔逆薑湯下 催生炒

蜀葵子酒下 安胎鹽酒下 室女經脈當通不通

四肢疼痛煎紅花酒下 血氣攻刺心腹疼痛煎當

歸酒下 血暈梭櫚燒灰酒調吞下 血邪研硃砂

麝香酒下 血悶煎烏梅湯研硃砂下 子宮久冷

溫酒或棗湯下空心日一服 血風勞人參酒吞下

小腹疔痛炒茴香鹽酒吞下 血散四肢遍身虛

浮黃腫赤小豆酒下 常服溫酒醋湯任下並空心

食前服

溫經澀脫小白薇丸

和劑

治婦人衝任虛損子臟受寒久

無子息及斷續不產此由上熱下冷百病滋生或月
水崩下帶漏五色腰腹疼重面黃肌瘦或因產乳不
能將護臨廁太早或久坐濕地或冷風從下入血臟
既虛風邪內乘或月水當行失于調攝傷動胞絡陰
陽不和上焦虛陽壅燥下藏邪冷結伏致死胎孕不
成冷極傷敗月水不勻飲食減少夜多盜汗面上黧

黠齒搖髮落脚膝疼重舉動少力並宜服之

覆盆子

去梗

菖蒲

微炒

遠志

去心

桃仁

去皮尖

白茯苓

去皮

藁本

去苗

卷柏

去根

肉桂

去粗皮

人參

白芷

各二分

白龍

骨

川椒

去目并合口

白薇

去苗各一兩

乾薑

炮

細辛

蛇牀子

去苗

當歸

去蘆

車前子

芍藥

各半兩

熟地黃

麥門冬

去心各一兩半

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九空心用溫酒或米飲送下此藥常服壯筋骨益血氣煖子

宮除風冷令人有子

白聖丹

和劑

治婦人三十六病崩中漏下身瘦手足熱惡

風怯寒咳逆煩滿抑息短氣心脅腰背肚腹與子藏
相引痛漏下五色心常恐懼遇恚怒憂勞即發皆是
內傷所致

白聖

牡蠣

煨

細辛

禹餘糧

火煨紅

醋淬研

龍骨

煨

附

子

炮去
皮臍

石葦

去毛

烏賊魚骨

煨

黃連

去毛

茯苓

去皮

瞿麥

穗

白斂

肉桂

去粗
皮

芍藥

白芷

白石脂

煨

當歸

去苗

乾薑

炮

人參

甘草

炙各一兩

川椒

去目并合口者炒出

汗半兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九空心用溫酒送下一方無人參

溫經養血琥珀澤蘭煎

和劑

治婦人三十六種血氣八風

五痺七癥八瘕心腹刺痛中風癰瘕手足痠疼乳中結瘀妊娠胎動胎死不出產衣不下敗血湊心頭旋眼花血注四肢渾身浮腫衝任久虛絕產無嗣早晚服食

或因有子經脈不調赤白帶下惡心嘔逆身體疲倦
懷八月一日一服滑胎易產

琥珀

澤蘭葉

去梗

牡丹皮

去心

紫巴戟

去心

糯米炒

茴香

五味子

去梗

五加皮

劉寄奴草

去枝

白芷

川當歸

酒浸

赤芍藥

金釵石斛

去根

川芎

白芍藥

生

地黃

洗焙

熟地黃

洗焙

人參

白朮

附子

艾葉

醋炒

糯米糊調成餅焙乾為末各一兩

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一九食前用溫

酒磨化服 漏胎刺痛煮糯米飲下 寒熱往來四

肢煩疼煎青蒿酒下 婦人室女經閉煎紅花酒下

血暈不省人事童子小便和煖酒下 催生雞子

清和酒下 血氣血塊攻刺心腹燒秤錘淬酒下

傷寒及中風口噤煎麻黃湯下以被蓋出汗即愈

心驚悸及頭痛薄荷酒下 咳嗽煎桑白皮湯下

血風攻症渾身瘙癢頭面麻痺炒黑豆浸酒下 產

後產前常服不生諸疾甚效

溫經理氣和血內灸散

和劑

治婦人產前產後一切血疾

血崩虛憊腹脇滿痛氣逆嘔吐冷血冷氣凝積塊硬
刺痛泄下青白或下五色腹中虛鳴氣滿堅脹瀝血
腰疼口吐清水頻產血衰顏色青黃勞傷劣弱月水
不調下血墮胎血迷血暈血瘀時發疼痛頭目眩暈
惡血上心悶絕昏迷惡露不乾體虛多汗手足逆冷並
宜服之

茴香

藿香

丁皮

熟地黄

洗焙

肉桂

去皮各一兩半

川

芎藭本

黃芪

去蘆

乾薑

炮各二兩

木香

一兩

陳皮

去白四兩

白芍藥

十兩

當歸

去蘆

山藥

白朮

白芷

甘草

炙赤

各八兩

右為末每服三錢水一大盞入生薑五片艾一團同煎至七分空心食前熱服溫酒調亦可如產後下血過多加蒲黃煎惡露不快加當歸紅花煎水瀉加肉豆蔻末煎嘔吐加藿香生薑煎上熱下冷加荊芥煎但是腹中虛冷血氣不和並宜服之

產後每日一服則百病不生丈夫虛冷氣刺心腹疼
痛尤宜服之

和血溫經勝金丸 治婦人久虛無子及產前後一切
病患兼治男子下虛無力此藥能安胎催生妊胎臨
月服五七九產時減痛婦人無子是子宮冷如服二
十九胎孕自成又治積年血風脚手麻痺半身不遂
赤白帶下血如山崩及治產後腹中結痛吐逆心痛
子死腹中繞臍痛氣滿煩悶失益汗不出月水不通

四肢浮腫無力血勞虛勞小便不禁中風不語口噤
產後痢疾消渴眼前見鬼迷暈敗血上衝寒熱頭痛
面色痿黃淋瀝諸疾血下無度血痢不止飲食無味
產後傷寒虛煩勞悶產後血癖產後羸瘦凡婦人衆
疾不問年深日近並宜服之一方名不換金丸治婦
人諸虛不足心腹疼痛

藁本

當歸

石脂

赤白皆可

白芍藥

人參

白薇

川芎

不見火

牡丹皮

桂心

白芷

白朮

米泔浸

白

茯苓

延胡

甘草

炙江西安撫司甘草沒藥減半

沒藥

各一兩

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一九溫酒化下
初產子用熱醋湯下食前服此方係王承宣憲祖傳
渠家凡婦懷身便服此藥甚有神效常服尤妙係在
京師子能家傳一方有沈香無沒藥一方有附子無
沈香

溫經理氣沈香煎丸

沈香

二錢半

丁香

一兩

麝香

二兩

白朮

七錢

官桂

乾薑

縮砂仁

白豆蔻

檳榔

各五錢半

青皮

南木香

肉豆蔻

胡椒

人參

生薑屑

訶子肉

陳

皮 甘草

各半兩

右為細末煉蜜和丸如棗子大每服一九細嚼生薑湯下溫紅酒亦可空心食前日進三服

濕脫燥溼溫中龍骨散

治腹下十二經絕產一曰白

帶二曰赤帶三曰經水不利四曰陰胎五曰子藏堅六曰藏癖七曰陰陽患痛八曰內強九曰腹寒十曰

藏閉十一曰五藏酸痛十二曰夢與鬼交並宜服之

龍骨

三兩

半夏

黃蘗

竈中黃土

桂心

乾薑

各二兩

石韋

滑石

各一兩

烏賊魚骨

代赭

各四兩

白

殭蠶

五枚

右治末節酒服方寸匕日三白多者加烏賊骨殭蠶

各二兩赤多者加代赭五兩小腹冷加竈土二兩子

藏堅加乾薑官桂各二兩以上多相病增之服藥三

月有子即佳藥太過多生兩子當審方取好藥寡婦

童女不可妄服

治錯雜之邪妙應丹 治婦人衆疾無所不治

晚蠱沙

炒

鯉魚鱗

燒為末

當歸

去蘆

石膏

煨研

澤蘭

去梗

附

子

炮去皮臍

木香

研各二兩

熟地黃

酒洗蒸焙

防風

去蘆

蕪荑

炒

馬

牙硝

柏子仁

微炒別研

川芎

人參

黃芪

蟬蛻

去足洗焙

白薇

檳榔

不見火

川椒

微炒各一兩

吳茱萸

湯泡七次

紅花

炒各半兩

藁本

去苗

白薑

炮

厚朴

去粗皮薑製

甘草

炙各三兩

右為細末煉蜜搜和杵數千下丸如彈子大每服一

九 血癥塊病綿灰酒下 催生細嚼溫酒下 血

勞血虛桔梗酒下 血崩椶櫚灰酒下 血氣痛炒

白薑酒下 血風荊芥酒下 血暈悶絕胎死腹中

胞衣不下並用生地黃汁童子小便酒各一盞煎二

沸調下 常服醋湯溫酒化生並空心食前服

攻積萬應紫苑丸 療臍腹久患疰癖如椀大及諸黃

病每地氣起時上氣衝心遶臍絞痛一切蟲咬十種

水病十種蠱病反胃吐食嘔逆惡心飲食不消天行

時病婦人多年月水不通或腹如懷孕多血天陰即
發又治十二種風頑痺不知年歲晝夜不安夢與鬼
交頭白多屑或哭或笑如鬼魅所著腹中積聚腹痛
及治小兒驚癇大人顛狂一切風及無孕婦人身上
頑麻狀如蟲行四肢俱腫呻吟等疾並皆治之功效
不可具述

紫苑

去苗土

柴胡

去鬚

葛蒲

吳茱萸

湯泡七次焙乾

厚朴

薑製

各一兩

桔梗

去蘆

茯苓

去皮

皂角

去皮炙

黃連

去鬚

桂枝

乾

薑

炮各八分

川烏

炮去皮七錢

羌活

去蘆

獨活

去蘆

防風

去蘆

巴豆

去皮

人參

去蘆

蜀椒

去目并合口者微炒出汗各半兩

出油

右為細末研勻煉蜜和丸如梧桐子大每服三九漸

加至五七丸食後臨臥生薑湯送下初有孕者不宜

服 痔漏腸風酒下 赤白痢訶子湯下 膿血痢

米飲湯下 墮傷血悶四肢不收酒下 蛔蟲咬心

檳榔湯下 打撲傷損酒下 中毒帚灰甘草湯下

氣噎憂噎荷葉湯下 一切風升麻湯下 寸白

蟲檳榔湯下 霍亂乾薑湯下 咳嗽杏仁湯下

腰腎痛豆淋酒下 陰毒傷寒溫酒下 吐逆生薑

湯下 食飲氣塊麴湯下 時氣井花水下 脾風

陳皮湯下 頭痛茶下 心痛溫酒下 大小便不

通燈草湯下 因物所傷以本物湯下 吐水藜蘆

湯下 熱病乾薑湯下 小兒天風吊搗防風湯下

防已亦可 小兒疳痢葱白湯下 小兒乳食傷白

湯下 月信不通煎紅花酒下 婦人腹痛川芎湯

下 懷孕半年後漏胎艾湯下 有子氣衝心酒下

產血暈溫酒下 血氣痛當歸酒下 產後心腹

脹滿豆淋湯下 難產益智湯下 產後血痢當歸

湯下 赤白帶下酒煎艾湯下 解內外傷寒粥飲

下 室女血氣不通酒下 子死葵子湯下

溫白丸 治婦人諸疾繼續而生帶下淋瀝五邪失心

憂愁思慮意思不樂飲食無味月水不調及腹中一

切疾病有似懷孕連年累月羸瘦困弊或歌或哭者

或如鬼所使但服此藥無不愈者

桔梗

柴胡

菖蒲

吳茱萸

湯泡七次焙乾

紫苑

去苗土

黃連

去毛

肉桂

去粗皮

厚朴

去粗皮薑汁炙

人參

去蘆

茯苓

去皮

皂

角

去皮炙

蜀椒

去目并合口炒出汗

巴豆

去皮心膜出油炒細研各半兩

川烏

炮去皮臍二兩半

右為細末研勻煉蜜和丸如梧桐子大每服三九漸

加至五七丸食後臨臥薑湯送下

證治準繩卷五十四

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷五十五

詳校官太醫院醫士臣程泰

編修臣倉聖脉覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官學正臣郭祚熾

謄錄監生臣饒文洲

欽定四庫全書

證治準繩卷五十五

明 王肯堂 撰

女科

調經門

經候總論

良岐伯曰女子七歲腎氣盛齒更髮長二七而天癸至任脈通太衝脈盛月事以時下天謂天真之氣癸謂壬

癸之水壬為陽水配丁而化木癸為陰水合戊而化火
故曰水火者陰陽之徵兆也女子陰類故得癸焉衝為
血海任主胞胎二脈流通經血漸盈應時而下天真氣
降與之從事故曰天癸也常以三旬一見以象月盈則
虧不失其期又名月信也若遇經行最宜謹慎否則與
產後證相類若被驚恐勞役則血氣錯亂經脈不行多
致勞瘵等疾若逆于頭面肢體之間則重痛不寧若怒
氣傷肝則頭暈脇痛嘔血而瘰癧癰瘍若經血內滲則

竅穴淋瀝無已凡此六淫外侵而變證百出犯時微若
秋毫成患重如山岳可不畏哉 薛血者水穀之精氣
也和調五臟灑陳六腑在男子則化為精在婦人上為
乳汁下為血海故雖心主血肝藏血亦皆統攝于脾補
脾和胃血自生矣凡經行之際禁用苦寒辛散之藥飲
食亦然 良婦人月水不調由風邪乘虛客于胞中而
傷衝任之脈損手太陽少陰之經蓋衝任之脈皆起于
胞中為經絡之海與手太陽小腸手少陰心經為表裏

上為乳汁下為月水然月水為經絡之餘苟能調攝得宜則經應以時矣 薛經曰飲食入胃游溢精氣上輸于脾脾氣散精上歸于肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行東垣先生謂脾為生化之源心統諸經之血誠哉是言也竊謂心脾平和則經候如常苟或七情內傷六淫外侵飲食失節起居失宜脾胃虛損心火妄動則月經不調矣有先期而至者有後期而至者其說詳見後條蓋血生于脾土故云脾統血凡血病當用苦

甘之劑以助陽氣而生陰血也 辨色丹經水者陰血也陰必從陽故其色紅稟火色也血為氣之配氣熱則熱氣寒則寒氣升則升氣降則降氣凝則凝氣滯則滯氣清則清氣濁則濁往往見有成塊者氣之凝也將行而痛者氣之滯也來後作痛者氣血俱虛也色淡者亦虛也而有水混之也錯經妄行者氣之亂也紫者氣之熱也黑者熱之甚也今人但見其紫者黑者作痛者成塊者率指為風冷而行溫熱之劑則禍不旋踵矣良由

病原論月水諸病皆曰風冷乘之宜其相習而成俗也
或曰黑北方水色也紫淡于黑非冷而何予曰經曰亢
則害承乃制熱甚者必兼水化所以熱則紫甚則黑也
况婦人性熱而見鄙嗜欲加倍藏府厥陽之火無日不
起非熱而何若曰風冷必須外得設或有之蓋千百一
二者也

冷證外邪初感入經必痛或不痛者久則鬱
而變熱矣且寒則凝既行而紫黑故非寒也

海四物加黃芩黃連湯 治經水如黑豆汁

四物湯 黃芩 黃連

兩

各一兩

右為末醋糊丸服

丹月經黑口渴倦怠形短色黑脈不勻似數

赤芍藥

香附米

各半兩

黃蘗

炒

黃芩

各三錢

甘草

二錢

右為末醋糊丸白湯下五六十九

永康胡八娘子二十歲二月經事不來忽行小腹痛有

塊血紫色

白芍藥

白朮

陳皮

各半兩

黃芩

川芎

木通

各二錢

甘草

炙少許

何穉人氣滯血澀脈不瀉經不調或前或後紫色口苦
兩大腿外腫麻木有時癢生瘡大便秘滯

麻子仁

桃仁

芍藥

各二兩

枳殼

白朮

歸頭

威靈仙

訶子肉

生地黄

陳皮

各五錢

大黃

七煨

錢

各為末粥丸如桐子大白湯下五六十丸

丹經水色淡者氣血俱虛也宜八物湯之類八物者四
物四君子也如兼他證隨證加藥

樓婦人年四十八因有白帶口渴月經多初血黑色後
來血淡倦怠食少臍上急

白朮

一錢半

白芍藥

陳皮

各一錢

木通

枳殼

黃

芩

各五分

縮砂仁

甘草

各三分

紅花

許莖

右煎湯下保和丸三十丸抑青丸二十九丸

審多少婦人病多是月經乍多乍少或前或後將發疼
痛醫者不審一例呼為經病不知陽勝陰陰勝陽所以
服藥無效蓋陰氣勝陽則包藏寒氣血不運行經所謂

天寒地凍水凝成冰故令乍少而在月後若陽氣乘陰則血流散溢經所謂天暑地熱經水沸溢故令乍多而在月前當和血氣平陰陽斯為福也

陽勝陰月候多者當歸飲

當歸飲 抑陽助陰調理經脈

當歸

微炒

地黃

酒蒸
焙

川芎

白朮

白芍藥

黃芩

各等

分

每服三錢水一盞半煎至八分空心溫服

陰勝陽月候少者七沸湯

七沸湯 治榮衛虛經水愆期或多或少腹痛

當歸 川芎 白芍藥 蓬朮 熟地黃 川薑

木香

各等分

每服四錢水一盞半煎至八分溫服

經水過多為虛熱為氣虛不能攝血

海四物加黃芩白朮湯 治經水過多

四物湯

四兩

黃芩

白朮

各一兩

丹經水過多

黃芩

炒

芍藥

炒

龜板

炙各一兩

椿樹根皮

七錢半

黃蘗

炒三

香附

錢二半

右為末酒糊丸空心白湯下五六十丸

丹一婦人脈弦而大不數形肥初夏時倦怠月經來時多此稟受弱氣不足攝血故行多

白朮

錢一

黃芪

生

陳皮

錢各一

人參

五分

甘草

炙三分

經水澀少為虛為澀虛則補之澀則濡之

海四物加葵花湯 治經水澀少

四物湯

四兩

葵花

一兩

一方又加紅花血見愁

四物湯加熟地黃當歸湯治經水而色和

四物湯

四兩

熟地黃

當歸

各一兩

脈師曰有一婦人來診言經水少不如前者何也師曰
曾更下利若汗出小便利者可何以故師曰亡其津液
故令經水反少設經下多于前者當所苦困當言恐大
便難身無復汗也

先期後期王子亨曰經者常候也謂候其一身之陰陽
愆伏知其安危故每月一至太過不及皆為不調陽太
過則先期而至陰不及則後時而來其有乍多乍少斷
絕不行崩漏不止皆由陰陽衰盛所致

丹經不及期者血熱四物湯加黃連 肥人不及日數
而多痰者血虛有熱南星白朮蒼朮黃連香附川芎作
丸 薛先期而至者 有因脾經血燥者宜加味逍遙
散 有因脾經鬱滯者宜歸脾湯

方見雜病
健忘門

有因肝

經怒火者宜加味小柴胡湯

方見傷寒少陽病

有因血分有

熱者宜加味四物湯

即四物加柴胡丹皮山梔

有因勞役火動者

宜補中益氣湯

方見雜病勞倦門

先期湯 治經水先期而來宜涼血固經

生地黃 川當歸 白芍藥

各二錢

黃蘗 知母

各一

錢條芩

黃連 川芎

阿膠

炒各八分

艾葉

香附

炙甘草

各七分

水二鍾煎一鍾食前溫服

金匱土瓜根散 治帶下經水不利小腹滿痛經一月

再見者

土瓜根 芍藥 桂枝 廔蟲

各七錢半

右四味杵為散酒服方寸匕日三服

按仲景此方乃破堅下血之劑則經不及期有汙血者矣前論所未及也欲知汙血有無須以小腹滿痛與不滿痛別之

丹經水過期血少川芎當歸人參白朮與瘀藥 過期

色淡者痰多也二陳湯加芎歸 過期色紫有塊血熱

也必作痛四物湯加香附黃連 薛過期而至者 有

因脾經血虛者宜人參養榮湯 有因肝經血少者宜

六味地黃丸 有因氣虛血弱者宜八珍湯

三方並見
雜病虛勞

門

過期飲 治經水過期不行乃血虛氣滯之故法當補

血行氣

熟地黃 白芍藥 當歸 香附 各二錢 川芎 一錢 紅

花

七分

桃仁泥

六分

蓬莪朮

木通

各五分

甘草

肉桂

各四分

水二鍾煎一鍾食前溫服

滋血湯 治婦人心肺虛損血脈虛弱月水過期

人參 山藥

黃芪

各一錢

白茯苓

去皮

川芎

當歸

白芍藥 熟地黃

各一錢半

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

脈師曰脈微血氣俱虛年少者亡血也乳子下利為可

否者此為居經二月一來師曰寸口脈微而澀微則衛氣不足澀則血氣無餘衛不足其息短其形躁血不足其形逆榮衛俱虛言語謬誤跌陽脈浮而濇濇則衛氣虛虛則短氣咽燥而口苦胃氣澀則失液少陰脈微而遲微則無精遲則陰中寒濇則血不來此為居經三月一來問曰婦人妊娠三月師脈之言此婦人非軀今月經當下其脈何類何以別之師曰寸口脈衛浮而大榮反而弱浮大則氣強反弱則少血孤陽獨呼陰不能

吸二氣不停衛降榮竭陰為積寒陽為聚熱陽盛不潤

經絡不足陰虛陽往

一作實

故令少血時發洒淅咽汗出

或溲稠數多唾涎沫此令重虛津液漏泄故知非軀畜

煩滿血月稟一經三月一來陰盛則瀉名曰居經

謂右脈洪

大左脈

反弱也

調經平劑簡易方當歸散 治經脈不勻或三四月不

行或一月再至

當歸 川芎

白芍藥

炒

黃芩

炒各

白朮

山茱

黃肉

半 一兩

右為細末空心溫酒調下二錢日三服 如冷去黃

芩加肉桂一兩

人參養血丸

和劑

治女人稟受素弱血氣虛損常服補衝

任調經候暖下元生血氣

烏梅肉

三兩

熟地黃

五兩

當歸

二兩

人參

川芎

赤芍

藥 蒲黃

炒各 一兩

右為細末煉蜜丸梧子大每服八十九溫酒米飲任

下

逍遙散

和劑

治血虛煩熱月水不調臍腹脹痛痰嗽潮熱

當歸

白朮

白芍藥

柴胡

茯苓

各一兩

甘草

炙半

兩

右咬咀每服半兩入薑薄荷葉煎服

薛新甫加牡丹皮山梔

炒

各五分名加味逍遙散神

巧萬全方無當歸芍藥甘草有人參黃芪各等分

增損四物湯 治月事不調心腹疼痛補血溫經駐顏

川芎 當歸 芍藥 熟地黄 牡丹皮 白朮

各一錢半 地骨皮 一錢

右作一服用水二鍾煎至一鍾食前服

濟生方論曰內經云百草皆生于氣經有所謂七氣有所謂九氣喜怒憂思悲驚恐者七氣也七情之外益之以寒熱二證而為九氣也氣之為病男子婦人皆有之惟婦人血氣為患尤甚蓋人身血隨氣行氣一壅滯則血與氣併或月事不調心腹作痛或月事將行預先作

痛或月事已行淋瀝不斷心腹作痛或遵腰脇或引背
脅上下攻刺吐逆不食甚則手足搐搦狀類驚癇或作
寒熱或為癰疽肌肉消瘦非特不能受孕久而不治轉
而為瘵疾者多矣

戴復菴云婦人每月經水應期而下不使有餘猶太陰
之缺也其有或先或後或少或多或欲來先病或遇來
而斷續皆謂之不調和氣飲加香附子五分兼照獨附
丸

升麻和氣飲

見雜病水腫門

澹寮煮附丸

治經候不調血氣刺痛腹脇膨脹頭暈

惡心崩漏帶下並宜服之

香附子

擦去皮不以多少米醋浸一日用瓦銚煮令醋盡

右醋糊為丸梧子大日乾每五十九丸淡醋湯下一

方香附一斤艾葉四兩當歸二兩製同名艾附丸

沈香降氣散 順氣道通血脈

烏藥 木香 香附子 縮砂仁 甘草

各等分

右為細末每服二錢空心鹽湯下

嚴氏抑氣散 治婦人氣盛于血變生諸證頭暈膈滿

香附子

四兩

茯苓

甘草

各一兩

陳皮

二兩

右為末每二錢食前沸湯調下

紺珠正氣天香湯 治婦人一切氣氣上湊心心胸攻

築脇肋刺痛月水不調

台烏藥

二錢

香附子

八錢

陳皮

蘇葉

各一錢

乾薑

半錢

右咬咀每七八錢水煎服

右抑氣例 煮附丸醋製佐以當歸則氣中之血藥也今世以童便酒醋鹽水四製而以四物佐之皆本于此人人知之故不著 氣鬱多者宜于雜病氣證門中選用不必拘此

東垣益胃升陽湯 治婦人經候不調或血脫後脈弱食少水泄日二三行

黃芪

二錢

白朮

三錢

炒麴

一錢

當歸身

陳皮

炙甘

草人參

各一錢

升麻

柴胡

各五分

黃芩

五分

去之

右咬咀每服半兩水煎腹痛加芍藥嗽去人參

補中益氣湯 治婦人室女經候不調脈微食少體倦

或熱

方見雜病首冊勞瘵門

四君子湯 六君子湯

方見雜病首冊虛勞門

右補氣例

調經煖劑大溫經湯

金匱

治衝任虛損月候不調或來多

不已或過期不行或崩中去血過多或經損娠瘀血

停留小腹急痛五心煩熱並皆治之

吳茱萸

湯泡

牡丹皮

白芍藥

肉桂

去鹿皮

人參

當歸

去蘆

芎藭

阿膠

碎炒

甘草

炙各一錢

麥門冬

去心一錢

半

夏

二錢半

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食前服

小溫經湯

簡易

治經候不調血臟冷痛

當歸 附子

炮各等分

右咬咀每服三錢水一盞煎八分空心溫服

溫經湯

和劑

治婦人血海虛寒月水不調

川芎 當歸 芍藥 蓬朮

各一錢半

人參

牛膝

各二

錢

桂心

牡丹皮

各一錢

甘草

五分

水二鍾煎至一鍾不拘時服

滋血湯 滋養榮血補婦人治血海久冷

當歸

一錢半

川芎

麥門冬

去心

牡丹皮

人參

芍

藥

琥珀

另研各一錢

半夏麴

官桂

阿膠

炒

酸棗

仁 甘草

各半錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服

加味吳茱萸湯 治衝任衰弱月候愆期或前或後或崩漏不止赤白帶下小腹急痛每至經脈行時頭暈飲食或少氣滿心怯肌肉不澤悉皆治之

半夏

二錢

吳茱萸

當歸

各一錢半

麥門冬

去心

乾薑

白

茯苓

苦梗

南木香

防風

牡丹皮

甘草

各一錢

官桂

牡蛎

各半錢

右作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎至一鍾食

前服

桃仁散 治婦人月水不調或淋瀝不斷斷後復來狀如瀉水四體虛倦不能飲食腹中堅痛不可行動月水或前或後或經月不來多思酸物

桃仁 半夏 當歸 川牛膝 桂心 人參

蒲黃 牡丹皮 川芎 澤蘭葉 赤芍藥

生地黄

各一錢半 粉草 半錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服

薑黃散 治血臟久冷月水不調臍腹刺痛

薑黃

片子者

白芍藥

各二錢

延胡索

牡丹皮

當歸

各一錢半

蓬朮

紅花

桂心

川芎

各一錢

右作一服水二鍾酒半鍾煎至一鍾不拘時服

紫石英丸

本

治婦人病多是月經乍多乍少或前或後

時發疼痛醫者一類呼為經病不曾說是陰勝陽是陽勝陰所以服藥少效蓋陰氣乘陽則胞寒氣冷血不運行經所謂天寒地凍水凝成冰故令乍少而在月後若陽氣乘陰則血流散溢經所謂天暑地熱經

水沸溢故令乍多而在月前當別其陰陽調其血氣使不相乘以平為期宜服此丸

紫石英

細研水飛

川烏

炮

杜仲

絲炒去

禹餘糧

煨醋

遠志

去心

澤瀉

桑寄生

桂心

龍骨

別研

當歸

人參

肉蓯蓉

酒浸

石斛

乾薑

炮

五味子

甘草

炙各一兩

牡

蠣

煨

川椒

去目并合口者不用炒出汗各半兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九食前用米飲湯下

暖宮丸 治衝任虛損下焦久冷月事不調不成孕育
崩漏下血赤白帶下並皆治之

生硫黃

六兩

赤石脂

煨火

海螵蛸

附子

炮去皮臍
各三兩

禹

餘糧

九兩
火
煨醋淬

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服三十九空心
用溫酒或醋湯送下

內補當歸丸 治血氣虛損月水不調或崩中漏下去

血過多肌體羸困及月水將行腰腿重痛並皆治之

當歸

去蘆炒

阿膠

炒

白芷

續斷

乾薑

炮

芍藥

甘草

炙各四兩

熟地黄

半兩焙

附子

炮去皮臍

白芍藥

肉桂

各二兩

吳茱萸

湯炮焙

白朮

各三兩

蒲黃

八錢炒

用溫酒送下

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九空心

熟乾地黄丸

治婦人風虛勞冷胃弱水穀不化或腸

虛受冷大便秘時泄或月水不調淋瀝不止或閉斷不

通結聚癥瘕久不成胎一切諸虛之證

熟地黃

五味子

各一兩半

栢子仁

炒另研

牛膝

去苗酒浸焙

芎藭

禹餘糧

火燉醋淬

白茯苓

去皮

肉蓯蓉

酒浸

卷栢

去根

山藥

厚朴

去粗皮製

乾薑

炮

白芷

細辛

去苗

防風

已上

各一兩

赤石脂

二兩煨另研

杜仲

去粗皮炙

蕪荑

炒

人參

去蘆

川

椒

去目并合口者

蛇牀子

艾葉

炒

續斷

各七錢

紫石英

煨另

研水飛

石膏

煨另研各三兩

當歸

去蘆炒

澤蘭

去梗

官桂

去粗皮各二兩

二錢半

石斛

一兩一錢半

甘草

炙一兩七錢半

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九空心

用溫酒或米飲送下

禹餘糧丸 治血虛煩熱月水不調赤白帶下漸成崩

漏

禹餘糧

火煨醋淬

白石脂

各一兩

附子

炮去皮臍

鼈甲

去裙醋炙

桑

寄生 白朮

厚朴

去粗皮製

當歸

去蘆

柏葉

炒

乾薑

炮各

一兩 白芍藥

狗脊

去毛各七錢半

吳茱萸

湯炮焙半兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十丸空心

用溫酒或米飲湯送下

鹿茸九 治衝任虛損又為風寒所乘尺脈微小甚者
可灸關元穴

鹿茸炙 赤石脂 禹餘糧各一兩 續斷二兩 栢葉 附

子炮 熟地黃 當歸酒浸 艾葉各七錢半

右為末酒糊丸梧子大每服五十九空心溫酒下

按此足少陰厥陰藥也今人多用之故收入治血虛
濕勝帶下甚捷

升陽舉經湯東垣 治經水不調右尺脈按之空虛是氣血

俱脫大寒證輕手其脈數疾舉指弦緊或澀皆陽脫之證陰火亦亡見熱證于口鼻眼或渴此皆陰燥陽欲去也當溫之降之引之燥之此法大升浮血氣補命門之下脫也諸藥言根近苗處去苗便是

柴胡根

當歸根

白朮

黃芪

各三錢

藁本

去土羌

活根

防風根

各二錢

紅花

白芍藥

各五分

獨活根

一錢半

桃仁

去皮尖研十枚

細辛

六分

川芎

熟地黃

水中沈者

人

參

去蘆

黑附子

炮去皮臍

甘草梢

炙各一錢

肉桂

去粗皮秋冬五分夏不用

右為粗末每服二錢水二盞煎至八分空心稍熱服
調經破血之劑紅花當歸散 治婦人血臟虛竭或積
瘀血經候不調或斷續不定時作腹痛腰膝重疼攻
刺小腹緊硬及室女月水不通並皆治之

紅花

紫葳

牛膝

白芷

蘇木

槌碎各一錢

桂心

一錢半

當歸尾

劉寄奴

各二錢

赤芍藥

三錢

甘草

半錢

右作一服水一鍾酒一鍾同煎至一鍾空心服

大延胡索散 治婦人經病并產後腹痛或腹滿喘悶

或癥瘕癖塊及一切心腹暴痛

延胡索 赤芍藥 川楝子 蓬莪朮 京三棱

煨

厚朴

薑製

當歸

黃芩

川芎

桔梗

檳榔

各一

錢

木香

官桂

去粗皮

甘草

各半錢

大黃

二錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

鼈甲丸 治婦人月經不調肌肉黃痺脇下積氣結痛

時發刺痛漸成勞狀

鼈甲

去裙脂炙

桂心

三棱

醋煮炒

牡丹皮

牛膝

去苗

琥

珀訶子

取肉

桃仁

去皮尖雙仁者麤炒

土瓜根

大黃

煨已上各

等分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服十五丸食前用桃仁湯送下

針灸心月經不調

陰獨

三分此穴大效須待經定為度在足四指間三壯

東又法內踝下白肉際青脈上灸隨年壯

集又法 中極 三陰交 腎俞 氣海

心經閉久忽大崩復又斷絕復又大行不調者 豐隆

六分 石門 五分
止血 斷經

婦人五旬經斷後再行或多或少或瘀或紅並下腹中

氣滿如胎孕 天樞 中脘 氣海 各五分
立愈

甲婦人漏下苦血閉不通逆氣脹血海主之 女子胞

中痛月水不以時休止天樞主之 千金作腹脹腸鳴氣上衝胸

小

腹脹滿痛引陰中月水至則腰脊痛胞中瘕子門有寒

引臛脾水道主之 千金引臛脾作大便小便不通

身痛產寶經水者行氣血通陰陽以榮于身者也氣血

盛陰陽和則形體通或外虧衛氣之充養內乏榮血之灌溉血氣不足經候欲行身體先痛也

越痛散 治血氣虛寒身體作痛

虎骨

銖五

茯苓

甘草

藁本

防風

白芷

當

歸

芍藥

續斷

白朮

附子

銖各三

右為粗末每服五錢水二盞薑五片棗二枚煎至一

盞不拘時服

腹痛良婦人經來腹痛由風冷客于胞絡衝任或傷于

太陽少陰經用溫經湯桂枝桃仁湯若憂思氣鬱而血

滯用桂枝桃仁湯地黃通經丸

方見經閉

若血結而成塊用

萬病丸

薛前證若風寒傷脾者六君子加炮薑

方見雜病

虛勞

思慮傷血者四物加參朮

方見雜病虛勞

思慮傷氣者歸脾

加柴梔

方見雜病健忘

鬱怒傷血者歸脾逍遙兼服餘參前後

論治之

戴經事來而腹痛者經事不來而亦腹痛者

皆血之不調故也欲調其血先調其氣四物湯加吳茱

萸半錢香附子一錢和氣飲加茱萸半錢亦可用痛甚

者延胡索湯然又恐感外邪傷飲食致痛痛不因血尤
宜詳審和氣飲却能兼治因冷而節因節而痛宜大溫
經湯冷甚者去麥門冬不用 丹抑氣丸治臨經之時
腹痛以四物湯加延胡索陳皮牡丹皮甘草痛甚以豆
淋酒痛少以童便煮香附入條芩為丸經水將來而痛
者四物湯加桃仁香附黃連

海八物湯 治經事將行臍腹絞痛臨經痛者血澀故
也

川芎

錢二

當歸

芍藥

熟地黄

錢各二

木香

檳榔

延胡索

苦楝

碎炒焦
各一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

本治婦人月經壅滯每發心腹臍疼痛不可忍及治產後惡露不快血上搶心迷悶不省氣絕欲死者琥珀散

京三稜

蓬莪朮

赤芍藥

劉寄奴

牡丹皮

熟地黄

官桂

菊花

真蒲黃

當歸

各一兩

濟生方無菊花蒲黃有延胡索烏藥

右前五味用烏豆一升生薑半斤切片米醋四升同
煮豆爛為度焙乾入後五味同為末每服二錢溫酒
調下空心食前服一方不用菊花蒲黃用烏藥延胡
索亦佳予家之秘方也若是尋常血氣痛只一服產
後血衝心二服便下常服尤佳予前後救人急切不
少此藥亦宜多合以濟人

大交加散 治榮衛不和月經湛濁逐散惡血腹痛經

血諸疾皆治之

生薑

二斤搗取汁存滓用

生地黄

二斤取汁存滓

白芍藥

當歸

桂心

各一兩

紅花

炒無惡血不用

沒藥

另研各半兩

延胡索

醋紙包煨

熟用布擦去皮

蒲黃

隔紙炒各一兩

右將地黄汁炒生薑滓生薑汁炒地黄滓各焙乾用

諸藥為細末每服三錢溫酒調下 若月經不依常

蘇木煎酒調下 若腰痛糖酒調下

交加地黄丸 治婦人經不調血塊氣痞肚腹疼痛

生地黃

搗汁存滓

老生薑

搗汁存滓各一斤

延胡索

當歸

川芎

芍藥

各二兩

明沒藥

木香

各一兩

桃仁

去皮尖

人參

各半兩

香附

半斤

右為末先以生薑汁浸地黃滓以地黃汁浸生薑滓
曬乾皆以汁盡為度共十一味作一處曬乾研為末
醋糊為丸空心以薑湯下

大交加散 治婦人榮衛不通經脈不調腹中撮痛氣
多血少結聚為癥產後中風

生地黄

生薑

各五兩各研取汁

右交互取汁浸一夕各炒黃漬汁盡為度末之尋常腹痛酒調下三錢產後尤不可闕

溫經湯

方見前

雲桂枝桃仁湯

治經候前腹痛不可忍

桂枝

芍藥

生地黄

各二兩

桃仁

四十枚

甘草

一兩

右為粗末每服五錢水二盞薑三片棗一枚同煎去

滓溫服

延胡索湯

濟生

治婦人室女七情傷感遂使血與氣併心

腹作痛或連腰脇或引背脊上下攻刺甚作搗搦經
候不調但是一切血氣疼痛並皆治之

當歸

去蘆酒浸剉炒

延胡索

炒去皮

蒲黃

炒

赤芍藥

官桂

不見火

各半兩

片子薑黃

洗

乳香

沒藥

木香

不見火各三錢

甘草

炙二錢半

右咬咀每服四錢水一盞半生薑七片煎至七分去

滓食前溫服吐逆加半夏橘紅各半兩

丹瘀血

香附子

醋煮
四兩

桃仁

去皮
失

牡丹皮

大黃

煨

當歸

各一

兩

川芎

紅花

各半
兩

瓦龍子

煨醋煮一
晝夜二兩

右炊餅為丸空心溫酒下三四丸

三神丸 治室女血氣相搏腹中刺痛痛引心端經行
澀少或經事不調以致疼痛

橘紅

二兩

延胡索

去皮
醋煮

當歸

去蘆酒浸別
畧炒各一兩

右為細末酒煮米糊為丸如梧子大每服七十九加

至百九空心艾湯送下米飲亦得

垣柴胡丁香湯 治婦人年三十歲臨經預先臍腰痛

甚則腹中亦痛經縮二三日

柴胡 羌活 丁香 全蝎 當歸身 生地黃

右都作一服水四盞煎至一盞去滓稍熱食前服

沒藥除痛散 逐寒邪療腹痛

蓬朮炮一兩 當歸焙 延胡索 五靈脂 肉桂去粗皮

良薑炒 蒲黃炒 甘草炙 沒藥各半兩

右為末每服五錢溫酒調服

妻一婦人三十歲每因浴後必用冷水淋通身又嘗大驚遂患經來時必先小腹大痛口吐涎水然後經行行後又吐水二日其痛直至六七日經水止時方住百藥不效予診其脈寸滑大而弦關尺皆弦大而急尺小于關關小于寸所謂前大後小也遂用香附三兩半夏二兩茯苓黃芩各一兩半枳實延胡牡丹皮人參當歸白朮桃仁各一兩黃連七錢川棟遠志甘草各半兩桂三

錢菜炙一錢半分十五貼水煎入生薑汁兩蜆殼熱服
後用熱湯洗浴得微汗乃已忌當風坐臥手足見水并
喫生冷服三十貼全愈半年後又因驚憂前病復舉腰
腹時痛小便淋閉心惕惕跳驚悸予意其表已解病獨
在裏先與灸少衝勞宮崑崙三陰交止悸定痛次用桃
仁承氣大下之下後用香附三兩蓬朮當歸身各一兩
半三稜延胡索桂大黃青皮俱醋製青木香懷香滑石
木通桃仁各一兩烏藥甘草縮砂檳榔苦楝肉各半兩

木香吳茱萸各二錢分作二十貼入新取牛膝濕者二錢生薑五片用荷葉湯煎服服訖漸安

右行血例

加味烏沈湯 治婦人經水欲來臍腹疼痛

烏藥

縮砂

木香

延胡索

各一兩

香附

炒去毛二兩

甘草

一兩半

右細剉每服七錢水一盞半生薑三片煎至七分不

拘時溫服

右抑氣例

薛一婦人經行腹疼食則嘔吐肢體倦怠發熱作渴此乃素稟氣血不足用八珍湯二十餘貼而愈後生子二年而經不行前證仍作服八珍湯逍遙散百餘劑方愈

八珍湯即雜病虛勞門八物湯

右補虛例

汪一婦人瘦小年二十餘經水紫色或前或後臨行腹痛惡寒喜熱或時感寒腹亦作痛脈皆細濡近滑兩尺

重按畧洪而滑此血熱也或謂惡寒如此何謂為熱曰
熱極似寒也遂用酒煮黃連四兩香附歸身尾各二兩
五靈脂一兩為末粥丸空腹吞之而愈

一婦年二十一歲六月經行腹痛如刮難忍求死脈得
細軟而駛尺則沈弱而近駛汪曰細軟屬濕數則為熱
尺沈屬鬱滯也以酒煮黃連半斤炒香附六兩五靈脂
半炒半生三兩歸身尾二兩為末粥丸空心湯下三四
錢服至五六料越九年得一子又越四年經行兩月不

斷腹中微痛又服前丸而愈續後經行六七日經止則
流清水腹中微痛又服前丸而痛亦止又經住只有七
八日若至行時或大行五六日續則適來適斷或微紅
或淡紅行後常流清水小腹大痛漸連遍身胸背腰腿
骨裏皆痛自己至酉乃止痛則遍身冷熱汗大出汗止
痛減尚能飲食自始痛至今歷十五年前藥屢服屢效
今罔效者何也汪復診之脈皆洪滑無力幸其尚有精
神汪曰此非舊日比矣舊乃鬱熱今則虛寒東垣曰始

為熱中終為寒中是也經曰脈至而從按之不鼓乃陰
盛隔陽當作寒治且始病時而形斂小今則形肥大矣
醫書曰瘦人血熱肥人氣虛豈可同一治耶所可慮者
汗大泄而脈不為汗衰血大崩而脈不為血減耳其痛
日重夜輕知由陽虛不能健運故亦凝滯而作痛以證
衆脈宜用助陽若得脈減痛輕方為佳兆遂投參芪歸
朮大劑加桂附一貼來早再診脈皆稍寧服至二三十
貼時當二月至五月病且愈蓋病有始終寒熱之異藥

有前後用舍不同形有肥瘦壯少不等豈可以一方而
通治哉

丹經過而作痛者乃虛中有熱所以作痛

新荷姐頭痛口乾經行後身痛腰甚痛

生地黄

白朮

芍藥

各一錢

芎藭

歸身尾

各五分

黃蘗

炒

甘草

各三分

右用水入少酒煎服

按經後腹痛為虛明甚若脈不數證無顯熱未可斷

其為熱也無熱八珍為宜有熱逍遙為宜

右寒熱例

發熱吳茱山治一婦經血過多五心煩熱日晡潮熱諸藥不效以四物加胡黃連三服而愈薛新甫治一婦人發熱口乾月經不調兩腿無力服祛風滲濕之劑腿痛體倦二膝浮腫經事不道薛作肝脾腎三經血虛火燥證名鸛膝風用六味八味二丸兼服兩月形體漸健飲食漸進膝腫漸消不半載而痊前證若脾腎虛寒腿

足輒痛或足膝枯細用八味丸若飲食過多腿足或臂
肉痠脹或浮腫作痛用補中益氣加茯苓半夏主之

一婦人經候過期發熱倦怠或用四物黃連之類反兩
月一度且少而成塊又用峻藥通之兩目如帛所蔽薛
曰脾為諸陰之首目為血脈之宗此脾傷五臟皆為失
所不能歸于目矣遂用補中益氣濟生歸脾二湯專主
脾胃年餘尋愈 一婦人月事未期而至發熱自汗用
清熱止汗之劑反作渴頭痛手掉身麻此因肝經風熱

用柴胡炒芩連炒山梔歸芍生地丹皮各一錢參芪苓
朮各一錢五分川芎七分甘草五分二劑其汗全止更
以補中益氣而愈凡發熱久者陽氣亦自病須調補之
一婦人氣血素虛經行不調飲食少思日晡熱甚用
十全大補加山茱萸山藥丹皮麥門冬五味子而愈次
年秋患寒熱或用清脾飲而元氣愈弱仍以前藥而愈
一婦人素勤苦冬初患咳嗽發熱久而吐血盜汗經
水兩三月一至徧身作痛或用化痰降火藥口噤筋攣

此血虛而藥益損耳用加減八味丸及補中益氣加麥
門五味山藥治之年餘而痊

寒熱經水適來適斷者或有往來寒熱者先服小柴胡
湯以去其寒熱後以四物湯和之

本婦人血脈不調往來寒熱狀如勞倦

當歸 川芎 甘草 黃芪 官桂

去粗皮
各一兩

熟地

黃 白朮 白芍藥

各二兩

柴胡

阿膠

各半兩

右為細末每服五錢棗一枚水煎空心溫服白湯點

服亦得常服不生帶下調血脈養子宮終身無病

太倉公治一女病腰背痛寒熱衆醫皆以為寒熱也公
診之曰內寒月事不下也即竄以藥旋下病已病得之
欲男子不可得也所以知其病者診其脈時切之腎脈
也嗇而不屬嗇而不屬者其來難堅故曰月不下肝脈
弦出寸口故曰欲男子不可得也蓋男子以精為主婦
人以血為主男子精盛則思室女子月盛則懷胎夫肝
攝血者也厥陰弦出寸部又上魚際則陰血盛可知矣

別詳師尼
寡婦條內

薛新甫治一婦人耳內或耳後項側作痛

寒熱口苦月經不調此肝火氣滯而血凝用小柴胡加山
梔川芎丹皮治之諸證悉退 月事不行而寒熱者詳
經閉門

熱入血室良婦人傷寒傷風發熱經水適來晝則安靜
暮則譫語有如癡狀此為熱入血室治者無犯胃氣及
上三焦宜服小柴胡湯若脈遲身涼當刺期門穴下針
病人五吸停針良久徐徐出針凡針期門穴必瀉勿補

肥人二寸瘦人寸半也 薛前證若因勞役或怒氣發熱適遇經行而患前證者亦用小柴胡湯加生地黃治之血虛用四物加柴胡若病既愈而熱未已或元氣素弱並用補中益氣湯脾氣素鬱用濟生歸脾湯血氣素虛用十全大補湯 許學士治一婦病傷寒發熱遇夜則如見鬼狀經六七日忽然昏塞涎壅響如引鋸牙關緊急瞑目不知人病勢危困許視之曰得病之初曾值月經來否其家云經水方來病作而經遂止得一二日

發寒熱晝雖靜夜則有鬼祟從日昨不省人事許曰此
乃熱入血室證仲景云婦人中風發熱惡寒經水適來
晝則明了暮則譫語如見鬼狀發作有時此名熱入血
室醫者不曉以剛劑與之遂致胸膈不利涎潮上脫喘
急息高昏冒不知人當先化其痰後除其熱乃急以一
呷散投之兩時頃涎下得睡省人事次授以小柴胡湯
加生地黃二服而熱除不汗而自解矣 一婦人患熱
入血室證醫者不識用補血調氣藥治之數日遂成血

結胸或勸用前藥許公曰小柴胡已遲不可行也無已
刺期門穴斯可矣予不能針請善針者治之如言而愈
或問熱入血室何為而成結胸也許曰邪氣傳入經絡
與正氣相搏上下流行遇經水適來適斷邪氣乘虛入
于血室血為邪所迫上入肝經肝受邪則譫語而見鬼
復入膈中則血結于胸中矣何以言之婦人平居水養
木血養肝方未受孕則下行之為月水既孕則中畜之
以養胎及已產則上壅之以為乳皆血也今邪逐血併

歸于肝經聚于臆中結于乳下故手觸之則痛非藥可
及故當刺期門也 虞恒德治一少婦夏月行經得傷
寒似瘧語狂亂諸醫皆以傷寒內熱投雙解散解毒
湯服之大汗如雨反如風狀次以牛黃丸金石之藥愈
投愈劇一日延虞診視脈弦而大虞思傷寒內熱狂亂
六陽俱病豈不口乾舌黑沉脈不數病體捫之或熱或
靜其腹急痛意必有內傷在前傷寒在後今傷寒得汗
雖已內傷則尚存故也因細問之患者曰正行經時因

飲食後多汗用冷水抹身因得此證方知冷水外閉其汗內阻其血邪熱入室經血未盡血得邪熱乍靜乍亂寒熱譫語掉眩類風須得玉燭散下之而愈下後譫語以定次以四物小柴胡湯調理五日熱退身涼其患遂瘳 衍義云一婦人溫病已十二日診之其脈六七至而濇寸稍大尺稍小發寒熱頰赤口乾不了了耳聾問之病數日經水乃行此屬少陽熱入血室也若治不對病則必死乃按其證與小柴胡湯服之二日又與小柴

胡湯加官桂乾薑一日寒熱遂止又云臍下急痛又與
抵當丸微利臍下痛瘥身漸涼脈漸勻尚不了了乃復
與小柴胡湯次日但胸中熱燥口鼻乾又少與調胃承
氣湯不得利次日心下痛又與大陷胸湯半服利三行
次日虛煩不寧時妄有所見復狂言雖知其尚有燥屎
以其極虛不敢攻之遂與竹葉湯去其煩熱其夜大便
自通至晚兩次中有燥屎數枚而狂言虛煩盡解但咳
嗽唾此肺虛也若不治恐成肺痿遂與小柴胡湯去人

參大棗生薑加乾薑五味子服一日咳減二日而病悉
愈以上皆用仲景方 薛立齋治一婦人經行感冒風
寒日間安靜至夜譫語用小柴胡加生地治之頓安但
內熱頭暈用補中益氣加蔓荊子而愈後因惱怒寒熱
譫語胸脇脹痛小便頻數月經先期此是肝火血熱妄
行用加味逍遙加生地黄而愈 一婦人因怒寒熱頭
痛譫語日晡至夜益甚而經暴至蓋肝藏血此怒動火
而血妄行用加味逍遙散加生地黄治之神思頓清但

食少體倦月經未已蓋脾統血此脾氣虛不能攝血用
補中益氣治之月經漸止 一婦人懷抱素鬱感冒經
行謔語服發散之劑不應 用寒涼降火前證益甚更加
月經不止肚腹作痛嘔吐不食痰涎自出此脾胃虛寒
用香砂六君脾胃漸健諸證漸退又用歸脾湯而全愈
加味小柴胡湯 治婦人傷風續得寒熱發作有時經
水適斷此為熱入血室其血必結致如瘧狀

柴胡

錢三

半夏

黃芩

錢各二

生地黄

人參

錢各一

甘

草

半錢

作一服水二鍾薑五片棗二枚煎一鍾不拘時服

乾薑柴胡湯 治婦人傷寒經脈方來熱入血室寒熱

如瘧或狂言見鬼並皆治之

柴胡

一錢

桂枝

三錢

枳實根

五分

牡蠣

煨

乾薑

炮

甘草

各炒

三分

右水煎服汗出而愈

海蛤散 治婦人傷寒血結胸膈宜服此藥及針期門

穴

海蛤

滑石

飛 水

甘草

各五錢

芒硝

一兩

右為末每服二錢用雞子清調下小腸通利其結血
自散更用桂枝紅花湯發其汗則愈

泄瀉汪石山治一婦經行必瀉三日然後行診其脈皆
濡弱此脾虛也脾屬血屬濕經水將動脾血先已流注
血海然後下流為經脾血既虧則虛而不能運行其濕
令作參苓白朮散每服二錢一日米飲調下二三次月

餘經行不瀉矣 一婦年逾四十形長體肥病經不調
右脈浮軟而大左脈虛軟而小近駛嘗時經前作泄今
年四月感風咳嗽用湯洗浴汗多因泄一月六月復因
洗浴發瘧六七次瘧雖止而神思不爽至八月盡而經
水過多白帶時下瀉泄遂覺右腳疼痛舊曾閃肭脚跟
今則假此延痛臂腿腰脇尻骨頸項右邊筋皆掣痛或
咳嗽一聲則腰眼痛如刀札日輕夜重叫號不已幸痛
稍止飲食如常今詳月水過多白帶時下日輕夜重瀉

泄無時亦屬下多亡陰宜作血虛論治服四物止痛之劑益甚九月汪復診視始悟此病乃合仲景所謂陽生則陰長之法矣夫經水多白帶下當泄瀉皆由陽虛陷下而然命曰陽脫是也日輕夜重蓋日陽旺而得健運之職故血亦無凝滯之患而日故輕也夜則陰旺而陽不得其任失其健運之常血亦隨滯故夜重也遂以參朮助陽之藥煎服五七貼痛減此亦病證之變治法殊常故記之

月水不斷婦人月水不斷淋瀝無時或因勞損氣血而傷衝任或因經行而合陰陽皆令氣虛不能攝血若時止時行腹痛脈沈細此寒熱邪氣客于胞中非因虛弱也 薛前證若鬱結傷脾用歸脾湯恚怒傷肝逍遙散肝火妄動加味四物湯脾氣虛弱六君子湯元氣下陷補中益氣湯熱傷元氣前湯加五味麥門炒黑黃蘗

儒者錢思習子室年三十餘無嗣月經淋瀝無期夫婦異處幾年矣思習欲為娶妾以謀諸余余謂此鬱怒傷

肝脾虛火動而血不歸經乃肝不能藏脾不能攝也當清肝火補脾氣遂與加味歸脾逍遙二藥四劑送至其家仍告其姑曰服此病自愈而當受胎妾可無娶也果病愈次年生子 一婦人性急每怒非太陽耳項頭齒胸乳作痛則胸滿吞酸吐瀉少食經行不止此皆肝火之證肝自病則外證見土受尅則內證作余先以四物加白朮茯苓柴胡炒梔炒龍膽清肝養血次用四君子加柴胡芍藥神麴吳茱萸炒黃連以培土制肝漸愈惟

月經不止是血分有熱脾氣尚虛以逍遙散倍用白朮
茯苓陳皮又以補中益氣加酒炒芍藥魚服而安 一
婦人多怒經行旬餘方止後淋瀝無期肌體倦瘦口乾
內熱盜汗如洗日晡熱甚皆由肝脾虧損無以生發元
氣用參芪歸朮茯苓神遠志棗仁麥門五味丹皮龍眼肉
炙草柴胡升麻治之獲痊 一婦人懷抱不舒腹脹少
寐飲食素少痰涎上湧月經頻數余曰脾統血而主涎
此鬱悶傷脾不能攝血歸源耳用補中益氣濟生歸脾

而愈

膠艾湯

治勞傷血氣衝任虛損月水過多淋瀝不斷

阿膠

炒

川芎

甘草

炙各二兩

當歸

艾葉

炒各三兩

熟地

黃

白芍藥

各四兩

右咬咀每服半兩水煎一方有黃芪

續斷丸

大

治月水不斷口乾心煩四肢羸乏飲食減少

川續斷

當歸

烏鰂骨

黃芪

牛角腮

燒

五

味子

甘草

龍骨

煨研

赤石脂

熟地黃

各一兩

地

榆

半兩

艾葉

附子

乾薑

川芎

各七錢半

右為末煉蜜丸梧子大每服三十九空心溫酒下

禹餘糧丸

治久冷月水不斷面黃肌瘦虛煩減食

禹餘糧

二兩

鹿角膠

七錢米粉炒

紫石英

續斷

赤石

脂熟地黃

川芎

各一兩

乾薑

黃芪

艾葉

栢葉

炒

當歸

炒

人參

白茯苓

各半兩

右為末煉蜜丸梧子大每三十九空心米飲下

牡蠣丸

治血海虛損月水不斷

牡蠣粉 赤石脂 代赭石 各一兩 阿膠 川芎

當歸 鹿茸 續斷 乾薑 各三兩 甘草 二錢半

右為末煉蜜丸梧子大每服三十九空心溫酒下

經驗方 治經血不止

黃芩 五分 當歸 栢葉 蒲黃 各四分 生薑 二分 艾葉 一分

生地黄 二錢四分 伏龍肝 十二分

右咬咀用水二升煎取八合分二服

又經血不止詩云婦人經血久淋瀝舊惡蓮蓬燒作

灰熱酒一杯調八字自然安樂更無疑

又方

蓮蓬殼

拒霜花

二味
等分

為末每服二錢空心米飲調下

伏龍肝散

和劑

治血氣勞傷衝任脈虛經血非時注下或

如豆汁或成血片或五色相雜臍腹冷痛月經不止

伏龍肝

麥門冬

去心

赤石脂

各一錢

熟地黄

艾葉

炒各一錢半

當歸

去蘆炒

川芎

各二錢五分

肉桂

去粗皮

乾薑

炒

甘草

各五分

右作一服水二鍾紅棗二枚煎至一鍾食前服

固經丸 治經水過多不止乃陰挾熱所致法當補陰

清熱

黃蘗

三兩

龜板

炙四兩

黃芩

二兩

白芍藥

三兩

槲根皮

一兩半

香附子

童便製一兩半

右為細末酒糊丸梧子大每以空心食前白湯下五

七十丸

月水不利良婦人月水不利者由勞傷氣血體虛而風
冷客于胞內傷于衝任之脈故也若寸脈弦關脈沈是
肝病也魚主腹疼乳竅生瘡尺脈滑血氣實經脈不利
或尺脈絕不至魚主小腹引腰痛氣攻胸膈也 薛前
證屬肝膽二經蓋肝膽相為表裏多因恚怒所傷若本
經風熱用補肝散

方見脇
痛門

血虛用四物加酸棗仁若腎

水不足用六味丸若患諸瘡瘍治見後

牛膝散 治月水不利臍腹作痛或小腹引腰氣攻胸膈

牛膝

酒製
一兩

桂心

赤芍藥

桃仁

去皮
夫

延胡索

炒

當歸

酒浸

牡丹皮

木香

各七
錢半

右為末每服一錢空心溫酒調下

牡丹散

治月候不利腹臍疼痛不欲食

牡丹皮

大黃

炒各
一兩

赤茯苓

桃仁

生地黄

當歸

桂心

赤芍藥

白朮

各七
錢半

石韋

去
毛

木香

各半

兩

右咬咀每服三錢水一盞薑三片煎七分空心溫服

產寶方 治女人月經不利臍下氣脹上攻欲嘔不得

睡

當歸

四錢

乾漆

三錢炒
令煙盡

右為細末蜜丸梧子大空心溫酒下十五丸

養榮湯 治婦人血海虛弱心中恍惚時多驚悸或發
虛熱經候不調

白芍藥 川芎 熟地黄 薑黃 當歸 川薑

青橘皮 五加皮 牡丹皮 海桐皮 白芷

各等

分

每服五錢水一盞半生薑五片烏梅一箇煎至一盞

溫服不拘時送紫桂丸五十粒

紫桂丸方
見帶下

過期不止產寶云男子生于寅寅屬木陽中有陰故男
子得八數女子生于申申屬金陰中有陽女子得七數
男以氣為主八八則卦數已盡盡則陽精痿女以血為
主七七則卦數已終終則經水絕任衝脈虛衰天癸絕
地道不通而無子矣或勞傷過度喜怒不時經脈衰微

之際又為邪氣攻衝所以當止不止而崩下也 許學
士云婦人經脈過期不及腰腹疼痛或七七數盡而月
經下者宜用當歸散治之

當歸散 治婦人天癸已過期經脈不勻或三四月不
行或一月再至腰腹疼痛素問云七損八益謂女子
七數盡而經不依時者血有餘也不可止之但令得
依時不腰痛為善

方見前調
經平劑條

行芩心丸 治婦人四十九歲已後天癸當住每月却

行或過多不止用黃芩心枝條者二兩米泔浸七日
炙乾又浸又炙如此七次為末醋丸如桐子大每服
七十九空心溫酒送下日進二服

右二方熱者宜之

茸附湯 補任衝調血氣

乾薑

四兩

肉桂

去粗皮

附子

龍骨

生用

防風

各一兩

牡蠣

煨

當歸

各二兩

鹿茸

三兩酒炙

每服五錢水二鍾煎八分溫服

補中芎藭湯 治風虛冷熱勞傷衝任月水不調崩中

暴下產後失血過多虛羸腹痛或妊娠胎動不安下

血

當歸 乾薑

炮各三兩

川芎

蜜炙

黃芪

甘草

炙

吳茱萸

炮黃

杜仲

炒

熟地黃

人參

各一兩

每服三錢水一鍾半煎一鍾空心服


右二方寒者宜之蓋亦有血海虛寒而不禁者也

薛前證若肝腎虛熱用當歸散肝血虛熱四物加柴梔

丹皮肝火內動小柴胡加山梔丹皮肝火血燥加味逍
遙散脾經鬱火加味歸脾湯肝脾鬱火歸脾逍遙兼服
肝腎虧損歸脾六味兼服仍與前後月經不調治驗同
用 一婦人年五十內熱晡熱經水兩三月一至此血
虛有熱用逍遙散加山茱萸治之而愈後有痰作渴或
小便不調或頭暈白帶用六味丸而安

脈問曰婦人年五十數一朝而清血二三日不止何也
何以治之師曰此婦人前絕生經水不下今反清血此

為居經不須治當自止經水下常五日止者五日愈



證治準繩卷五十五